



Esta es la razón por la que debería considerar la prescripción de VASCEPA[®] (icosapent etilo) para proteger su corazón

Solo la prescripción de VASCEPA le da un 25 % de protección extra del corazón cuando se toma con una estatina

Es hora de ir más allá de las estatinas cuando se trata de la salud del corazón. Si tiene una enfermedad cardiovascular o diabetes y triglicéridos altos (≥ 150 mg/dL), haga más por su corazón con VASCEPA.

Clínicamente comprobado

Se ha demostrado clínicamente que VASCEPA reduce en un 25 % la posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un ACV que pone en peligro la vida del paciente cuando se añade a una estatina*. En un estudio clínico, los pacientes tratados con VASCEPA tuvieron menos eventos cardiovasculares (17,2 %) en comparación con los que tomaron placebo (22 %).

Aprobado por la FDA

Solo VASCEPA está aprobado por la FDA para reducir el riesgo de ataque cardíaco o ACV cuando se añade a una estatina para esta indicación.

Sin sustituto genérico

El icosapent etilo genérico y los omega-3 que contienen DHA, como Lovaza[®] (ésteres etilos de ácido omega-3) no están clínicamente comprobados y no están aprobados por la FDA para reducir el riesgo de infarto de miocardio o ACV.

Sin pruebas para el aceite de pescado

Después de revisar décadas de investigación, la FDA descubrió que los suplementos dietéticos de aceite de pescado no cumplen con el estándar requerido para una declaración de salud científica significativa.

Compruebe su receta para ver si se especifica "Dispensar según lo escrito (DAW)" o "Marca médicamente necesaria". Si no es así, pida a su médico que lo añada; es bastante importante.

Pague tan solo \$9 durante 90 días; consulte los detalles de elegibilidad en el reverso.[†]

Estudio *REDUCE-IT[®]. *N Engl J Med.* 2019;380(1):11-22.

[†] Los detalles de ahorro para los pacientes asegurados comercialmente ofrecen restricciones en la parte posterior.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿QUÉ ES VASCEPA?

VASCEPA es un medicamento con receta usado para lo siguiente:

- Junto con determinados medicamentos (estatinas), para reducir el riesgo de infarto al corazón, ACV y determinados tipos de problemas cardíacos que requieren hospitalización en adultos con enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o con diabetes y dos o más factores de riesgo adicionales de enfermedad cardíaca.

No se sabe si VASCEPA es seguro y eficaz en los niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿QUIÉN NO DEBE TOMAR VASCEPA?

- No tome VASCEPA si es alérgico al icosapent etilo o a cualquiera de los ingredientes de VASCEPA.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA?

VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación y aleteo auricular).

Consulte la Información de seguridad importante adicional en el reverso y la Información de receta completa adjunta, incluida la Información para el paciente.

No hay sustituto: Solo VASCEPA® le da a su corazón protección adicional cuando se toma con una estatina

Recuerde que VASCEPA es diferente a los fenofibratos (Trilipix® [ácido fenofíbrico]), que son tratamientos para reducir los triglicéridos. Los fenofibratos no están aprobados por la FDA para reducir el riesgo de ataque cardíaco o ACV con una estatina.

La cápsula no es de tamaño real.



Con la tarjeta de ahorro VASCEPA, los pacientes con seguro comercial pueden pagar tan poco como

\$9 por 90 días*
(solo \$3 al mes!).

Sujeto a disponibilidad. Se aplican restricciones.*



Escanee las instrucciones paso a paso para obtener VASCEPA.



Asegúrese de que en su receta se indique "Dispensar según lo escrito (DAW)" o "Marca médicamente necesaria" para asegurarse de recibir la protección cardíaca que necesita

*No puede utilizarse para obtener medicamentos recetados pagados en parte por programas federales o estatales de asistencia sanitaria, incluidos Medicare, Medicaid, Medicare Advantage, Medicare Parte D, Tricare y VA. No debe ser utilizado por residentes de MA o VT, o por profesionales médicos autorizados en esos estados, pacientes menores de 18 años, donde esté prohibido por la ley o por el plan de seguro del paciente, o donde esté gravado o restringido. Máximo ahorro de \$150 al mes o \$450 por un suministro de 90 días. Los pacientes elegibles son los que participan en un seguro comercial, a través de un intercambio de asistencia sanitaria, o que pagan en efectivo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA? (continuación)

VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (continuación)

Se han producido problemas de ritmo cardíaco que pueden ser graves y causar hospitalización en personas que toman VASCEPA, especialmente en personas que padecen enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o diabetes con un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) o que han tenido problemas de ritmo cardíaco en el pasado. Informe a su médico si tiene algún síntoma de problemas de ritmo cardíaco, como sensación de que su corazón late rápido e irregularmente, aturdimiento, mareos, falta de aliento, molestias en el pecho o si se desmaya.

- **Posibles reacciones alérgicas si es alérgico al pescado o a los mariscos.** Deje de tomar VASCEPA e informe a su médico inmediatamente o busque ayuda médica de emergencia si tiene algún signo o síntoma de una reacción alérgica.
- **Hemorragias.** Pueden producirse hemorragias graves en las personas que toman VASCEPA. El riesgo de hemorragia puede aumentar si también está tomando un medicamento anticoagulante.

Si tiene problemas de hígado y está tomando VASCEPA, su médico debe realizarle análisis de sangre durante el tratamiento.

Los efectos secundarios más comunes de VASCEPA incluyen los siguientes:

- Dolor muscular y de articulaciones
- Hinchazón de las manos, las piernas o los pies
- Estreñimiento
- Gota
- Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación auricular)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VASCEPA. Llame a su médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos adversos (p, ej., efectos secundarios) o quejas sobre el producto poniéndose en contacto con AmarinConnect llamando al 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372), a través de un correo electrónico escribiendo a AmarinConnect@Amarincorp.com o llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Informe a su médico si toma medicamentos que afectan la coagulación de la sangre (anticoagulantes).

Consulte la Información de receta completa adjunta, incluida la Información para el paciente.



Los logotipos de VASCEPA, REDUCE-IT, Amarin y Vascepa/Amarin son marcas registradas del grupo de empresas Amarin. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivas empresas.

© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA. Todos los derechos reservados. US-VAS-03429 09/21

Vascepa®
(icosapent ethyl)



No acepte ningún sustituto:

Cómo obtener el VASCEPA® (icosapent etilo) que le recetó su médico

PASO 1: En la oficina del médico



Revise su receta para ver si se especifica "Dispensar según lo escrito (DAW)" o "Marca médicamente necesaria (BMN)". Si no es así, pida a su médico que lo añada; es bastante importante.

¿Por qué? Porque si no se anota "DAW" o "BMN", el farmacéutico puede pensar que no hay problema de sustituir VASCEPA con un medicamento genérico. Si lo es, así que asegúrese de obtener la protección CV aprobada por la FDA con VASCEPA, según lo recetado.

PASO 2: Durante la entrega de la farmacia



*Sujeto a elegibilidad. Se aplican restricciones.

Muestre su tarjeta de ahorro VASCEPA* a su farmacéutico si tiene un seguro comercial.

¿Por qué? Porque las farmacias pueden intentar ahorrarle dinero con los genéricos. Asegúrese de decirles que los genéricos (icosapent etilo, omega-3 que contiene DHA) y los suplementos dietéticos de aceite de pescado no pueden proporcionar una protección cardíaca comprobada como lo hace VASCEPA.

Ahorre en su compra de VASCEPA enviando VASCEPA al 26789. Su n.º de ID es: 59021139303.

PASO 3: Al recogerlo en la farmacia



Asegúrese de tener el medicamento de marca que le recetó su médico antes de salir de la farmacia.

¿Por qué? Porque su médico le recetó específicamente VASCEPA, aprobado por la FDA, para que pueda obtener una protección cardíaca comprobada. Con cada reposición, recuerde pedir específicamente VASCEPA.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿QUÉ ES VASCEPA?

VASCEPA es un medicamento con receta usado para lo siguiente:

- Junto con determinados medicamentos (estatinas), para reducir el riesgo de infarto al corazón, ACV y determinados tipos de problemas cardíacos que requieren hospitalización en adultos con enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o con diabetes y dos o más factores de riesgo adicionales de enfermedad cardíaca.

No se sabe si VASCEPA es seguro y eficaz en los niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿QUIÉN NO DEBE TOMAR VASCEPA?

- No tome VASCEPA si es alérgico al icosapent etilo o a cualquiera de los ingredientes de VASCEPA.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA?

VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación y aleteo auricular).

Consulte la Información de seguridad importante adicional en el reverso y la Información de receta completa adjunta, incluida la Información para el paciente.

Vascepa
(icosapent ethyl)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE VASCEPA? (continuación)

VASCEPA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes: (continuación)

Se han producido problemas de ritmo cardíaco que pueden ser graves y causar hospitalización en personas que toman VASCEPA, especialmente en personas que padecen enfermedades cardíacas (cardiovasculares) o diabetes con un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular) o que han tenido problemas de ritmo cardíaco en el pasado. Informe a su médico si tiene algún síntoma de problemas de ritmo cardíaco, como sensación de que su corazón late rápido e irregularmente, aturdimiento, mareos, falta de aliento, molestias en el pecho o si se desmaya.

- **Posibles reacciones alérgicas si es alérgico al pescado o a los mariscos.** Deje de tomar VASCEPA e informe a su médico inmediatamente o busque ayuda médica de emergencia si tiene algún signo o síntoma de una reacción alérgica.
- **Hemorragias.** Pueden producirse hemorragias graves en las personas que toman VASCEPA. El riesgo de hemorragia puede aumentar si también está tomando un medicamento anticoagulante.

Si tiene problemas de hígado y está tomando VASCEPA, su médico debe realizarle análisis de sangre durante el tratamiento.

Los efectos secundarios más comunes de VASCEPA incluyen los siguientes:

- Dolor muscular y de articulaciones
- Hinchazón de las manos, las piernas o los pies
- Estreñimiento
- Gota
- Problemas de ritmo cardíaco (fibrilación auricular)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VASCEPA. Llame a su médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios. Puede notificar efectos adversos (p, ej., efectos secundarios) o quejas sobre el producto poniéndose en contacto con AmarinConnect llamando al 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372), a través de un correo electrónico escribiendo a AmarinConnect@Amarincorp.com o llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Informe a su médico si toma medicamentos que afectan la coagulación de la sangre (anticoagulantes).

Consulte la Información de receta completa adjunta, incluida la Información para el paciente.



Los logotipos de VASCEPA, Amarin y Vascepa/Amarin son marcas registradas del grupo de empresas Amarin. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivas empresas.

© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA.
Todos los derechos reservados. US-VAS-03433 09/21

Vascepa[®]
(icosapent ethyl)

