



這是您應考慮使用 VASCEPA® (icosapent ethyl) 保護您的心臟的原因
**只有處方 VASCEPA® 能在您服用他汀類藥物時為您增加
25% 心臟保護率**

講到心臟健康，是時候超越他汀類藥物了。如您患有心血管疾病、或糖尿病及高三酸甘油酯 (≥ 150 mg/dL)，請服用 VASCEPA 讓您的心臟更好康復。

經臨床證明

經臨床驗證，VASCEPA 與他汀藥物一併使用時，可將危及生命的心臟病發作或中風的機率降低 25%。^{*}在一項臨床研究中，與服用安慰劑之患者 (22%) 相比較，接受 VASCEPA 治療的患者出現心血管事件 (17.2%) 的機率較低。

FDA 核准

僅 VASCEPA 已獲 FDA 核准用於在加入他汀類藥物時降低您的心臟病發作或中風的風險。

無學名藥替代品

學名藥 icosapent ethyl 及含有 DHA 的 omega-3s，例如 Lovaza® (omega-3 酸乙酯) 未有經過臨床驗證，亦未獲 FDA 核准用於降低您的心臟病發作或中風的風險。

無明顯魚油

在經過數十年研究後，FDA 發現魚油膳食補充劑不符合重大科學健康聲明之標準。

檢查您的處方，看一下是否有規定「遵醫囑配藥 (DAW)」或「品牌醫療需要」。如無，請要求醫生加入；此項非常重要。

僅需 \$9 的低價格即可享用 90 日；請參閱背面瞭解獲取優惠之資格。[†]

^{*}REDUCE-IT® study. N Engl J Med. 2019;380(1):11-22.

[†]商業保險患者提供項目限制之節省詳情，請參閱背面。

適應症及重要安全資訊

什麼是 VASCEPA?

VASCEPA 為以下用途之處方藥物：

- 與部分藥物 (他汀類藥物) 一併使用，以減少患有心臟 (心血管) 疾病或糖尿病以及超過兩個其他心臟病風險因素的成年人患心臟病、中風及部分類型需要入院治療之心臟問題風險。

VASCEPA 是否對兒童安全有效，乃未知因素。

重要安全資訊

誰不應服用 VASCEPA 藥物?

- 如對 icosapent ethyl 或 VASCEPA 任何成分敏感，請勿服用 VASCEPA。

VASCEPA 有什麼可能出現的副作用?

VASCEPA 可能引起嚴重副作用，包括：

- 心律問題 (心房纖維性顫動及心房撲動)。

請參閱背面之額外重要安全資訊以及隨附之完整處方資訊，包含患者資訊。

無任何替代品：只有 VASCEPA® 能在您服用他汀類藥物時為您增加心臟保護率

請謹記，VASCEPA 有別於非諾貝特類藥物 (Trilipix® 緩釋膠囊 [fenofibric acid])，屬於降低三酸甘油酯之治療。非諾貝特未獲 FDA 核准用於與他汀類藥物一併使用而減低心臟病或中風之風險。



膠囊並非實際大小。

使用 VASCEPA 儲蓄卡、持有商業保險的患者，僅需

\$9 的低價格即可享用 90 日*
(每月僅需 \$3!)

視乎供應量而定。適用限制條款。*



掃描此處瞭解獲取 VASCEPA 之逐步指引。



請確認是否有規定「遵醫囑配藥 (DAW)」或「品牌醫療需要」之規定是否已列入您的處方，以保證您是否獲得所需之經證實心臟保護

*不得用於由聯邦或州醫療計畫部分支付之處方藥，包括 Medicare、Medicaid、Medicare Advantage、Medicare Part D、Tricare 及 VA。不適用於麻薩諸塞州或佛蒙特州居民，或在該等州份有執照之醫療專業人員、18歲以下之患者、法律或患者保險計畫被禁止使用，或受徵稅或限制使用之地方。最多可節省金額為每月 \$150，或 90 日供應期間 \$450。合資格患者包括參加商業保險、透過醫療保健交易所或以現金支付之患者。優惠期至 2022 年 12 月 31 日。

重要安全資訊 (續)

VASCEPA 有什麼可能出現的副作用？(續)

VASCEPA 可能引起嚴重副作用，包括：(續)

在服用 VASCEPA 的人員中，特別是患有心臟 (心血管) 疾病、或有心臟 (心血管) 疾病風險因素的糖尿病之人士，或曾有心律問題之人士，其心律問題有轉為嚴重的可能性，且會引致入院留醫。如您出現任何心律問題之症狀，例如心跳過快且不規則、眩暈、呼吸急促、胸部不適或昏厥，請告知您的醫生。

- **如您對魚類或貝類敏感，則有可能出現過敏反應。**如您出現過敏反應的跡象或症狀，請立即停止服用 VASCEPA 並立即告知您的醫生，或尋求緊急醫療協助。
- **出血。**服用 VASCEPA 的人員會出現嚴重出血。倘若您亦有服用血液稀釋劑，則出血風險有可能增加。

如您有肝臟問題且正在服用 VASCEPA，您的醫生應在治療期間進行血液檢查。

VASCEPA 最為常見的副作用包括：

- 肌肉及關節疼痛
- 手、腳或腳掌腫脹
- 便秘
- 痛風
- 心律問題 (心房纖維性顫動)

這些並非 VASCEPA 可能出現的全部副作用。請致電醫生獲取關於副作用之醫療建議。如需報告不良事件 (例如，副作用) 或作出產品投訴，請聯絡 AmarinConnect (電話號碼為 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372)，電子信箱為 AmarinConnect@Amarincorp.com) 或致電 FDA (電話號碼為 1-800-FDA-1088)。

如有服用影響血液凝固的藥物 (抗凝血劑或血液稀釋劑)，請告知您的醫生。

請參閱隨附之完整處方資訊，包括患者資訊。



VASCEPA、Amarin、REDUCE-IT 及 Vascepa/Amarin 標誌為 Amarin 集團公司之註冊商標。所有其他商標均為其各自所屬公司之材料。

© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA. 保留一切權利。US-VAS-03430 10/2021

Vascepa®
(icosapent ethyl)



不接受任何替代品： 如何獲得您的醫生開出的 VASCEPA® (icosapent ethyl)

第 1 步： 在醫生的診症室



檢查您的處方，看一下是否有規定「遵醫囑配藥 (DAW)」或「品牌醫療需要 (BMN)」。
如無，請要求醫生加入；此項非常重要。

為何？倘若未有註明「DAW」或「BMN」，藥劑師可能會認為可以使用學名藥代替 VASCEPA。因此，請保證您能夠按處方獲得 FDA 核准的 VASCEPA 範圍內的 CV 保護。

第 2 步： 在配藥期間



*須符合資格要求。適用限制條款。

如您持有商業保險，請向您的藥劑師出示您的 VASCEPA 儲蓄卡*。

為何？藥房可能出於為您節省金錢的理由而使用學名藥。請務必告知他們，學名藥 (icosapent ethyl、含有 DHA 的 omega-3s) 及魚油膳食補充劑無法提供像 VASCEPA 一樣經證實的心臟保護。

傳送簡訊 VASCEPA 至 26789，以保留 VASCEPA 您的 ID# 為：59021139303。

第 3 步： 在取藥期間



請務必取得醫生開出的品牌藥，方可離開藥房。

為何？您的醫生專門為您處方中開出 FDA 核准之 VASCEPA，因此您可獲得經證實的心臟保護。請在每一次取藥時特別要求提供 VASCEPA。

適應症及重要安全資訊 什麼是 VASCEPA？

VASCEPA 為以下用途之處方藥物：

- 與部分藥物 (他汀類藥物) 一併使用，以減少患有心臟 (心血管) 疾病或糖尿病以及超過兩個其他心臟病風險因素的成年人患心臟病、中風及部分類型需要入院治療之心臟問題風險。

VASCEPA 是否對兒童安全有效，乃未知因素。

重要安全資訊

誰不應服用 VASCEPA 藥物？

- 如對 icosapent ethyl 或 VASCEPA 任何成分敏感，請勿服用 VASCEPA。

VASCEPA 有什麼可能出現的副作用？

VASCEPA 可能引起嚴重副作用，包括：

- 心律問題 (心房纖維性顫動及心房撲動)。

請參閱背面之額外重要安全資訊以及隨附之完整處方資訊，包含患者資訊。

Vascepa®
(icosapent ethyl)



重要安全資訊 (續)

VASCEPA 有什麼可能出現的副作用? (續)

VASCEPA 可能引起嚴重副作用,包括:(續)

在服用 VASCEPA 的人員中,特別是患有心臟(心血管)疾病、或有心臟(心血管)疾病風險因素的糖尿病之人士,或曾有心律問題之人士,其心律問題有轉為嚴重的可能性,且會引致入院留醫。如您出現任何心律問題之症狀,例如心跳過快且不規則、眩暈、呼吸急促、胸部不適或昏厥,請告知您的醫生。

- **如您對魚類或貝類敏感,則有可能出現過敏反應。**如您出現過敏反應的跡象或症狀,請立即停止服用 VASCEPA 並立即告知您的醫生,或尋求緊急醫療協助。
- **出血。**服用 VASCEPA 的人員會出現嚴重出血。倘若您亦有服用血液稀釋劑,則出血風險有可能增加。

如您有肝臟問題且正在服用 VASCEPA,您的醫生應在治療期間進行血液檢查。

VASCEPA 最為常見的副作用包括:

- 肌肉及關節疼痛
- 手、腳或腳掌腫脹
- 便秘
- 痛風
- 心律問題(心房纖維性顫動)

這些並非 VASCEPA 可能出現的全部副作用。請致電醫生獲取關於副作用之醫療建議。如需報告不良事件(例如,副作用)或作出產品投訴,請聯絡 AmarinConnect (電話號碼為 1-855-VASCEPA (1-855-827-2372),電子信箱為 AmarinConnect@Amarincorp.com) 或致電 FDA (電話號碼為 1-800-FDA-1088)。

如有服用影響血液凝固的藥物(抗凝血劑或血液稀釋劑),請告知您的醫生。

請參閱隨附之完整處方資訊,包括患者資訊。



VASCEPA、Amarin 及 Vascepa/Amarin 標誌為 Amarin 集團公司之註冊商標。所有其他商標均為其各自所屬公司之材料。

© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA.

保留一切權利。US-VAS-03434 09/21

Vascepa[®]
(icosapent ethyl)

