

立刻添加至您的心脏保护计划



使用本指南与您的医生讨论关于 VASCEPA 如何帮助您降低**持续性心血管风险 (P-CVR)**——即使您正在服用他汀类药物并管理心血管风险因素,但心血管 (CV) 风险仍然存在。**如果您还没有这样做,则预约一位医生,并注意询问医生 VASCEPA 是否适合您。**

第 1 步：了解您的心血管风险

许多不同的因素都会增加 CV 事件发生的风险,例如心脏病发作或卒中。检查下列所有适用于您的 CV 风险因素,然后向您的医生了解更多关于您个人风险水平的信息。

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 既往 CV 事件,例如心脏病发作或卒中 | <input type="checkbox"/> CV 疾病家族史 | <input type="checkbox"/> 高血压 |
| <input type="checkbox"/> 糖尿病 | <input type="checkbox"/> 高胆固醇 | <input type="checkbox"/> 高甘油三酯 |
| <input type="checkbox"/> 吸烟史 | <input type="checkbox"/> 超重/肥胖 | <input type="checkbox"/> 年龄(男性 45+ 岁,女性 55+ 岁) |
| <input type="checkbox"/> 肾脏问题 | <input type="checkbox"/> 低体力活动 | <input type="checkbox"/> 手臂或腿部血液流动问题 (PAD) |

第 2 步：告知医生您正在服用的药物

如果您使用了影响血液凝固的药物(抗凝血剂或血液稀释剂),您的医生希望对您进行监查。服用 VASCEPA 的患者可能会出现严重出血。如果同时使用血液稀释剂,可能会增加出血的风险。

您服用的药物和补充剂对您心脏健康发挥的作用是否充分。例如,鱼油补充剂和奥米加 3 酸乙酯、非诺贝特和烟酸等药物并未经过 FDA 批准可与他汀类药物一并服用以降低 CV 风险。

适应症与重要安全信息

VASCEPA 是什么？

VASCEPA 是一种处方药,用途如下：

- 与某些药物(他汀类药物)合并用药,对于患有心脏(心血管)疾病或糖尿病和具有 2 种或更多附加心脏病风险因素的成人患者,可降低心脏病发作、卒中和需要住院治疗的某些类型心脏问题的风险。
- 与低脂和低胆固醇饮食合并用药,以降低 成人体内较高的甘油三酯(脂肪)水平。

目前尚不清楚 VASCEPA 是否会改变您患胰腺炎症(胰腺炎)的风险。

目前尚不清楚 VASCEPA 对儿童是否安全有效。

重要安全信息

VASCEPA 禁服患者？

- 如果您对二十碳五烯酸乙酯或 VASCEPA 中的任何成分过敏,请勿服用 VASCEPA。

VASCEPA 的潜在副作用是什么？

VASCEPA 可能会导致严重的副作用,包括：

- 心脏节律问题(房颤和房扑)。**在服用 VASCEPA 的患者中,发生了可能很严重且导致住院治疗的心脏节律问题,尤其是那些有心脏(心血管)疾病或具有心脏(心血管)疾病风险因素的糖尿病患者,或者既往有心脏节律问题的患者。如果您有任何心脏节律问题的症状,如感觉心跳加快和心跳不规则、头晕目眩、眩晕、呼吸短促、胸部不适或晕倒,请告知您的医生。

请另见下一页的重要安全信息。

患者信息

VASCEPA® (pronounced vas-EE-puh) (二十碳五烯酸乙酯) 胶囊

VASCEPA 是什么?

VASCEPA 是一种处方药,用途如下:

- 与某些药物(他汀类药物)合并用药,对于患有心脏(心血管)疾病或糖尿病和具有 2 种或更多附加心脏病风险因素的成人患者,可以降低心脏病发作、卒中和需要住院治疗的某些类型心脏问题的风险。
- 与低脂和低胆固醇饮食合并用药,以降低成人体内较高的甘油三酯(脂肪)水平。

目前尚不清楚 VASCEPA 是否会改变您患胰腺炎(胰腺炎)的风险。

目前尚不清楚 VASCEPA 对儿童是否安全有效。

如果您对二十碳五烯酸乙酯或 VASCEPA 中的任何成分过敏,

请勿服用 VASCEPA。有关完整的 VASCEPA 成分列表,请见本说明书末尾。

服用 VASCEPA 之前,请告知您的医生关于您的所有医疗状况,包括是否:

- 患有糖尿病。
- 有低甲状腺问题(甲状腺功能减退)。
- 有肝脏问题。
- 有胰腺问题。
- 对鱼类或贝类过敏。目前尚不清楚对鱼类或贝类过敏的人是否也对 VASCEPA 过敏。
- 怀孕、或计划怀孕。目前尚不清楚 VASCEPA 是否会对胎儿造成伤害。
- 处于母乳喂养中、或计划母乳喂养。VASCEPA 会流入您的母乳,可能会伤害您的宝宝。如果您服用 VASCEPA,请咨询您的医生关于喂养宝宝的最好方法。

告知您的医生关于您服用的所有药物,包括处方药和非处方药、维生素、膳食补充剂或草药补充剂。

VASCEPA 会与您正在服用的某些其他药物产生相互作用。

特别是,如果您使用了影响血液凝固的药物(抗凝血剂或血液稀释剂),请告知您的医生。

应该如何服用 VASCEPA?

- 完全谨遵医嘱服用 VASCEPA。
- 在未告知您的医生的情况下,请勿改变剂量,也请勿停止服用 VASCEPA。
- 请勿服用超过医生所开处方的胶囊数量。
 - 如果医生开了 0.5 克的胶囊,您每天随食物服用的胶囊数量应不超过 8 粒。
 - 如果医生开了 1 克的胶囊,您每天随食物服用的胶囊数量应不超过 4 粒。
- 请整粒吞服 VASCEPA 胶囊。吞服前请勿弄破、压碎、溶解或咀嚼 VASCEPA 胶囊。
- 如果您漏服了一剂 VASCEPA,请记得马上服用。不过,如果您漏服了一天的 VASCEPA,在您服用时请勿加倍剂量。
- 在您服用 VASCEPA 之前,您的医生可能会让您开始采用低饱和脂肪、低胆固醇、低碳水化合物和低添加糖的饮食。在服用 VASCEPA 的同时保持这种饮食方式。
- 在您服用 VASCEPA 时,您的医生可能会为您做血液检查,以检查您的甘油三酯和其他脂质水平。

VASCEPA 的潜在副作用是什么?

VASCEPA 可能会导致严重的副作用,包括:

- **心脏节律问题(房颤和房扑)。**
在服用 VASCEPA 的患者中,发生了可能很严重且导致住院治疗的的心脏节律问题,尤其是那些有心脏(心血管)疾病或具有心脏(心血管)疾病风险因素的糖尿病患者,或者既往有心脏节律问题的患者。如果您有任何心脏节律问题的症状,如感觉心跳加快和心跳不规则、头晕目眩、眩晕、呼吸短促、胸部不适或晕倒,请告知您的医生。
- **如果您对鱼类或贝类过敏,可能会出现过敏反应。**如果您有任何过敏反应的体征或症状,请立即停止服用 VASCEPA,并告知您的医生或寻求紧急医疗救助。
- **出血。**服用 VASCEPA 的患者可能会出现严重出血。如果同时使用血液稀释剂,可能会增加出血的风险。

如果您的肝脏有问题,且正在服用 VASCEPA,那么您的医生应该在治疗期间为您做血液检查。

VASCEPA 最常见的副作用包括:

- 肌肉关节痛
- 手、腿或脚肿胀
- 便秘
- 痛风
- 心脏节律问题(房颤)

这些并不是 VASCEPA 所有的潜在副作用。请致电您的医生,咨询关于副作用的医疗建议。您可以拨打 1-800-FDA-1088,向 FDA 报告副作用。

应该如何贮存 VASCEPA?

- 应在 68° 至 77° F (20° 至 25° C) 的室温下贮存 VASCEPA。
- 安全地扔掉过期或不再需要的药物。

将 VASCEPA 和所有药物放在儿童无法触及之处。

关于 VASCEPA 安全有效使用的一般信息。

所开处方药的有时并非如同患者信息说明书所列。请勿将 VASCEPA 用于没有开处方药的疾病。请勿将 VASCEPA 给予他人,即使他们有和您一样的症状。这可能会有损他们的身体健康。您可以向药剂师或医疗保健提供者询问有关为医护人员编写的 VASCEPA 信息。

VASCEPA 的成分是什么?

活性成分:二十碳五烯酸乙酯

非活性成分:生育酚、明胶、甘油、麦芽糖醇、山梨醇和纯净水

VASCEPA 是 Amarin 公司集团的注册商标。

©2019 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater NJ, 08807.保留所有权力

经销商:Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ, USA

专用厂商:Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited Dublin, Ireland

+1-855-VASCEPA (+1-855-827-2372) www.vascepa.com

更多信息,请访问 www.vascepa.com 或致电 1-855-VASCEPA

(1-855-827-2372)。

该患者信息已经过美国食品药品监督管理局批准。

PP00120M 修订日期:12/2019



VASCEPA, Amarin 和 Vascepa/Amarin 徽标是

Amarin 公司集团的注册商标。

© 2021 Amarin Pharma, Inc. Bridgewater, NJ 08807 版权所有。US-VAS-03443 11/21

Vascepa[®]
(icosapent ethyl)

